

FICHE D'INFORMATION

A LIRE AVANT TOUTE PRÉPARATION DE RADIOTHÉRAPIE AVEC INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE

Pour la préparation de radiothérapie (ou simulation ou scanner de préparation), une **injection de produit de contraste** peut être prévue. Cette injection permet de repérer avec précision les vaisseaux sanguins des zones anatomiques qui vont être traitées et contribue ainsi à la sécurité des soins prévus.

Cette injection demande **quelques précautions** :

- assurez-vous d'*avoir signalé au médecin*
 - une éventuelle réaction après injection d'un produit lors d'un examen antérieur ;
 - une grossesse éventuelle ;
 - si vous présentez un diabète, une allergie (en particulier à l'iode), de l'asthme, de l'hypertension artérielle ou une maladie cardiaque, rénale ou de la thyroïde ;
- faites *pratiquer le prélèvement* au laboratoire de votre choix de la « créatinine sérique » (ordonnance remise par le médecin lors de la consultation de 1^{ère} fois) ;
- *allez à la pharmacie* vous procurer les produits prescrits par le médecin et suivez les prescriptions ;
- **La veille** de la préparation, *hydratez-vous* bien en buvant au minimum 1,5 litre de boisson non alcoolisée
- **Après** le scanner, *hydratez-vous* de nouveau en buvant au minimum 1,5 litre de boisson non alcoolisée afin que le produit de contraste s'élimine rapidement.

Au moment de la préparation, lorsque le/la manipulateur/trice injecte le produit, vous pouvez ressentir des fourmillements, en particulier dans la gorge, une sensation de chaleur, un mal de tête. Ce sont des effets normaux. Toute autre sensation doit être signalée.

Dans les deux jours qui suivent la préparation, vos urines et vos selles peuvent prendre une légère coloration bleutée. Ceci n'est pas inquiétant.

Vous pouvez toujours nous joindre pour toute question au 01 34 23 23 65.