

ARBRE DÉCISIONNEL POUR SOINS DE BOUCHE

Bouche SAINE

SOINS D'HYGIÈNE = Brosser les dents, la langue. Nettoyer et reposer les prothèses. Hydrater. Faire boire.

SOINS PRÉVENTIFS à faire sans prescription, sur rôle propre IDE.

Cavité buccale : BICARBONATE® de Na à 1,4%.
Gargarisme à renouveler jusqu'à 6 fois/24h.

Lèvres : Cold cream, stick labial, vaseline.
Si O2 : BIOXTRA®* gel humectant
*à rapporter par la famille

Rôle propre IDE

Bouche ALTERÉE

Bouche SÈCHE

Bouche DOULOUREUSE

Bouche INFECTÉE

Soins d'hygiène et soins préventifs à faire sans prescription, sur rôle propre IDE

Si croûtes :

1. Brosser la langue + coca cola ou ananas
2. Traitement local :
DUPHALAC® (tapisser la cavité buccale)
BIOXTRA®* 4 fois/jour
LANSOYL®* 4 fois/jour
*à rapporter par la famille

Si persistance :

Bain de bouche eau oxygénée

MUCITE, PLAIE, ...

1. XYLOCAINE® visqueuse 2% en application locale (effectuer à 1H d'intervalle des repas)
2. ASPIRINE® (acide acétylsalicylique) sachet ou effervescent dilué dans l'eau en bain de bouche
3. Traitement antalgique par voie générale si besoin

HÉMORRAGIQUE

EXACYL® (acide tranexamique)
1g/10ml dilué ou non, en bain de bouche

MYCOSE

1. Traitement local : TRIFLUCAN®, en suspension buvable
2. Traitement par voie générale : TRIFLUCAN® (fluconazole)

ULCÉRATION VIRALE

1. **Aphtes** : ULCAR®* (sucralfate) en bain de bouche dilué ou non (à rapporter par la famille)
2. **Herpès** : ZOVIRAX® (aciclovir) 200mg/5ml suspension buvable, en bain de bouche

MALODORANTE (bactérienne)

1. Traitement local : FLAGYL®* (métronidazole) suspension buvable
2. Traitement par voie générale : FLAGYL®* IV
*dans le cadre d'une prise en charge palliative terminale

Bouche sèche



Mycose



Mucite



Aphtes



BAIN DE BOUCHE

1. Protocoles détaillés :

CONTENANT	PREPARATION	POSOLOGIE
Eau oxygénée	1/3 eau oxygénée + 2/3 eau tiède	3 fois/jour
Acide acétylsalicylique sachet ou effervescent (ASPIRINE®)	500mg dilué dans un verre d'eau	3 fois/jour
Acide tranexamique (EXACYL®) dilué ou pur.	250ml de Bicarbonate de Na 1,4% + 2 ampoules d'Acide tranexamique buvable 1g/10ml.	2 à 3 fois/jour
Metronidazole (FLAGYL®) suspension buvable	Badigeonnage pur	4 à 6 fois/jour

Du fait du manque de données disponibles sur la stabilité des mélanges de bain de bouche, il est recommandé de ne pas conserver ces mélanges.

2. Conseils dans les prises en charge palliatives :

- ✓ Stimulation de la salive : Glaçons, bonbons, eau gélifiée, boissons pétillantes (si pas de lésions).
Éviter les aliments secs et salés.
- ✓ Dans le cas d'une bouche hémorragique : Éviter les aliments chauds et durs.
Favoriser les aliments doux et froids.
- ✓ Ne pas utiliser de produits alcoolisés tels : [Hextril®](#), [Eludril®](#), produits qui assèchent la bouche.
- ✓ Soins de bouche plaisir (avec ce qu'aime le patient : café, jus d'orange...).