


Fiche pratique pour mise en place d'une sédation palliative d'urgence

Sous condition de prescription

Etape 1 : Induction de la sédation (= Titration)

Dans une seringue de 10ml
Préparer 10mg de MIDAZOLAM Pur (Hypnovel®), soit 2 ampoules de 5 mg /5 ml
Pour une concentration 1 mg/1 ml (Hypnovel® pur)
Prévoir une seringue de rinçage 10 cc de NaCl 0,9%

Prévoir robinet trois voies pour injecter au plus près du patient



VOIE IV

Injecter toutes les 1 min
0,5 à 1ml de MIDAZOLAM
Rincer avec le NaCl entre 2 administrations

VOIE SC ou IM (deltoïde)

Injecter toutes les 10 min
2,5ml de MIDAZOLAM
Rincer avec le NaCl entre 2 administrations

Jusqu'à somnolence avec froncement des sourcils à l'étirement du lobe de l'oreille ou jusqu'à obtenir un **score de Richmond (RASS) à -4 à -5.**

Etape 2 : Maintien de la sédation (si nécessaire)

1. Préparation et Mise en place

PSE de MIDAZOLAM en IV ou en SC selon prescription médicale.
Avec une **concentration de 1mg pour 1ml.**

Posologie horaire de MIDAZOLAM égale à 50 % de la dose totale qui aura été nécessaire lors de la **titration.**

2. Surveiller la profondeur de la somnolence (Richmond -4) et la fréquence respiratoire (FR)

Toutes les 15 mn pendant la 1ère heure, puis 4 fois/ jour